АНТРАКС

Антраксът е остро инфекциозно заболяване, което се причинява от микроорганизъм, наречен *Bacillus anthracis,* характеризиращ се със способността си при попадане във външната среда да образува спори, които са изключително устойчиви. Човек може да се зарази при попадане на антраксни спори по кожата и лигавиците, при поглъщане или вдишване на антраксни спори. В зависимост от начина на заразяване са възможни следните клинични форми на заболяването от антракс:

- кожна
- гастро - интестинална (стомашно-чревна)
- белодробна (дихателна)

Инкубационен период

Инкубационният период, последващ заразяването с антракс е средно 5 дни, но може да варира в доста широки граници, в зависимост от начина на заразяване и големината на дозата.

Клинична характеристика на гастро-интестиналната форма на антракс

Най-типични прояви са: болки в корема, гадене, повръщане и повишена температура след консумиране на заразена храна (обикновено сурово или недопечено месо). Възможна е също кървава диария и хематемеза (повръщане на кръв). В много редки случаи при антракс на храносмилателната истема могат да се наблюдават симптоми като: повишена температура, оток на шията и локална аденопатия със затруднено гълтане, болки в гърлото и задух. В устната кухина могат да се наблюдават язви, покрити с псевдомембрана, които засягат задната стена, твърдото небце и сливиците. Симптомите могат да напомнят за тежък стрептококов фарингит.

Всяка от клиничните форми на антракс, при която присъства бактериемия, може да бъде усложнена с менингит.

Лабораторно доказване

Заболяването може да бъде доказано само чрез лабораторни микробиологични изследвания.

Мерки по отношение на болните

Потвърждаване на диагнозата и лечението се извършват в болница със задължително прилагане на антимикробни препарати. Препаратът Ciprofloxacin е средство на избор за началното лечение и алтернатива за последващото лечение при вероятен или потвърден случай на заболяване от гастро-интестинална или дихателна форма на антракс.

Най-важното, което хората трябва да знаят е, че:

- Лицата*, изложени на въздействието на B. anthracis не са заразни;*
- *Има антибиотици, които са ефективни за постекспозиционна профилактика, която трябва да започне възможно най-бързо.*
- *При съмнение за бруцелоза не трябва да се предприема самолечение, а веднага да се потърси специализирана лекарска помощ.*